



BSV BILAN 2018

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMPAGNE

• Bilan climatique régional (Source Météo France)

L'automne 2017 est encore une fois marqué par des conditions très sèches. Les pluies sont rares et le déficit hydrique s'installe dès le mois d'octobre.

Les pluies font leur retour en décembre et restent excédentaires en janvier (3^e mois de janvier le plus pluvieux à l'échelle régionale après 1996 et 2004). D'abord froides en décembre, les températures sont très douces en janvier. L'hiver reprend ses droits en février avec le retour du froid et plusieurs épisodes neigeux en plaine.

Le début du printemps est très agité et les perturbations sont fréquentes. Le mois de mars enregistre un nombre record de jours de pluie. D'abord faibles et associés à des épisodes gélifs en mars, les températures repartent nettement à la hausse en avril (2 à 3°C > aux normales). Puis un régime orageux s'installe en mai avec de nombreux épisodes de violents orages amenant des cumuls de précipitations supérieurs de 40 à 50 % aux normales.

Ce régime orageux et fortement pluvieux se maintient sur la première quinzaine de mois de juin, avec encore de forte pluies et plusieurs épisodes de grêle (jusqu'à 2 fois le niveau de précipitation « normal » pour les zones les plus arrosées).

L'été s'installe plus franchement dès la fin du mois de juin. Juillet reste chaud et ensoleillé mais toujours très orageux. De violents orages surviennent encore mi-juillet, toujours ponctuellement accompagnés de grêle. Les précipitations estivales restent donc globalement excédentaires sur la zone Midi-Pyrénées.

Les températures déjà chaudes augmentent encore fin juillet pour devenir caniculaires, conditions qui vont se prolonger jusqu'à début août. Puis, malgré quelques rafraîchissements ponctuels, les températures estivales restent supérieures aux normales de saison (+ 2 à 3° C). Août 2018 se classe au 4^e rang des mois d'août les plus chauds derrière 1911, 1977 et très loin derrière août 2003.

La pluie devient rare, trop rare. Et l'été se termine sur des conditions toujours chaudes et sèches jusqu'à la fin du mois de septembre.

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00


Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

Comité de validation :

Chambre d'agriculture de Hte-Garonne, Chambre régionale d'Agriculture d'Occitanie, DRAAF Occitanie, Vinovallée Cave de Fronton



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.



Pluviométries et températures moyennes mensuelles comparées aux données mensuelles des quinze dernières années
Station de Vacquières - Campagne 2017-2018

• Stades phénologiques

Stades clés Négrette	Stade 5 Pointe verte	Stade 9 Feuilles étalées	Stade 17 Boutons floraux séparés	Stade 19 Début floraison	Stade 25 Fin floraison	Stade 33 Fermeture de la grappe	Stade 35 Début Véraison
2015	15 avril	20-25 avril	20-25 mai	30 mai	10 juin	30 juin	25-30 juillet
2016	5 avril	20 avril	15 mai	5 juin	15-20 juin	5-10 juillet	10 août
2017	30 mars	15-20 avril	25 mai	30 mai	1 ^{er} - 5 juin	20-25 juin	1 ^{er} août
2018	10 avril	20-25 avril	20-25 mai	1 ^{er} - 5 juin	15 juin	1 ^{er} juillet	5-10 août

Le **débourrement** s'effectue dans des conditions normales et à des dates qui restent dans la moyenne des dernières années.

La végétation démarre dans des conditions favorables en avril, sans dégâts de grêle ni gel significatifs. La croissance bénéficie ensuite des températures estivales de la fin avril. Ainsi, la phénologie, d'abord dans la moyenne, prend une tendance précoce début mai, au moment de l'apparition des ébauches de grappes.

Mais, le rafraîchissement notable des températures en mai **ralentit l'entrée en floraison**. Mi-mai, les boutons floraux sont visibles et la végétation stagne et prend peu à peu une couleur jaunâtre, signe de mauvaises conditions de développement.

Le stade 17 s'éternise et les premières fleurs apparaissent fin mai. La **floraison, qui démarre lentement** début juin, est **très étalée et très hétérogène** (souvent au sein même des parcelles).


L'installation de conditions estivales fin juin favorise ensuite la nouaison puis le grossissement des baies. Jusqu'à atteindre la **fermeture des grappes vers mi-juillet**, en toutes situations.

A un printemps humide succède un été chaud et sec. Des symptômes d'échaudage vont apparaître sur le feuillage en diverses situations, dès mi-juillet. Les parcelles de Loin de l'œil sont les plus touchées.

La **véraison** s'engage dans des dates plutôt moyennes. Les premières baies vérees sont visibles sur les derniers jours de juillet. Puis le phénomène se généralise plus rapidement, dès la première semaine d'août.

Les conditions caniculaires du mois d'août vont ensuite ralentir la progression de la véraison.

Les vendanges débutent à des dates « normales » pour les cépages précoces et se déroulent dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de l'absence de pluies. Mais les vendanges doivent être anticipées pour les cépages tardifs à cause des conditions sèches et des degrés qui s'envolent.



BILAN SANITAIRE DE LA CAMPAGNE

Les conditions particulièrement humides du printemps font de 2018 une année à mildiou. Et le régime orageux des pluies a compliqué la gestion des risques et des protections phytosanitaires. Les dégâts réguliers voire ponctuellement sévères sur grappes témoignent de la virulence de l'épidémie.

A l'inverse, l'oïdium qui peut être préjudiciable, notamment sur les parcelles à historique, est resté sans incidence majeure.

Le black-rot se maintient dans le trio de tête, d'autant plus que les conditions orageuses du printemps ont été favorables aux contaminations. Les dégâts les plus importants sur grappes seront toutefois issus des orages de début juillet intervenant juste avant la fermeture de la grappe. Ces attaques tardives confirment, cette année encore, l'importance des stades nouaison-fermeture dans la gestion du Black-rot.


Malgré un début de saison chaotique qui favorise le développement de foyers réguliers de botrytis, les conditions caniculaires du mois d'août vont permettre d'en limiter l'impact.

Côté ravageurs, erinose et cicadelle verte font bien sûr partie du panorama de l'année sans toutefois générer de dégâts majeurs.

Le développement important de la confusion sexuelle rend de moins en moins impactant le vers de grappe sur le vignoble. Néanmoins, des niveaux d'attaque en fin de G1 (comptage de glomérules) conduisant ponctuellement au dépassement du seuil de risque, laissent entrevoir que la pression de l'année est plutôt forte.

Fréquence et intensité des attaques de bio-agresseurs détectés dans le réseau d'observations Campagne 2018

La gravité de l'attaque combine donc la fréquence et l'intensité de l'attaque des parcelles touchées. Ces paramètres reflètent la pression sanitaire de l'année, sans prendre en compte la mise en œuvre des différentes stratégies de protection.



Légende : Fréquence = régularité des dégâts observés - Intensité = gravité des dégâts observés

Niveaux d'attaque de nul = 0 à fort = 3

+, - et = : évolution de la pression par rapport à l'année antérieure

MALADIES

• Mildiou (*Plasmopara viticola*)

• Début de saison

Le début de saison est doux et sec. La pression se maintient à un niveau faible jusqu'à la fin du mois d'avril.

Le suivi de maturité des « œufs d'hiver » réalisé en labo et complétant la donnée modèle à cette période de la saison montre qu'une partie des lots (2 lots sur les 4 suivis) sont aptes à sporuler dès la fin du mois d'avril (observations du 26 avril). Le top départ de la période de nuisibilité est alors donné.

• Premières contaminations

Les pluies de fin avril et début mai entretiennent un niveau de pression sans toutefois générer de contaminations. Ce sont les orages de mi-mai (12 au 15 mai) qui vont provoquer les premières sorties significatives de symptômes au vignoble (TNT et parcelles de référence) ainsi que les premières sorties sporadiques sur grappes, observées fin mai (semaine 22).

Les orages survenant le 22 mai provoquent de nouvelles contaminations

• Déroulement de la campagne

Début juin, la pression modélisée devient forte et toute pluie même faible est susceptible de déclencher de nouvelles contaminations.

Ce qui coïncide avec une période particulièrement arrosée. En effet, les passages orageux s'enchaînent jusqu'à mi-juin et entraînent des contaminations importantes à chaque pluie.

La virulence des premières contaminations est bien révélée par les TNT sur lesquels les dégâts sur grappes augmentent fortement entre début et mi-juin (semaines 23 et 24) suite aux pluies de mi-mai et fin mai.

Au vignoble, les symptômes qui restaient rares jusqu'au 5 juin, deviennent plus réguliers sur feuilles à partir du 10 juin (semaine 24). C'est notamment à cette période que deviennent visibles les conséquences des défaillances des dispositifs de protections : la moindre faille donne lieu à des sorties de taches.

Puis, fin juin (semaine 26), les sorties des taches attendues suite aux pluies des 10-12 juin donnent un tournant ponctuellement critique à l'épidémie.

Sur les quelques TNT encore en place, les dégâts progressent fortement sur grappes.


Au vignoble, les attaques deviennent très régulières et la maladie est désormais présente sur feuillage dans une majorité de parcelles (à des fréquences variables). Sur grappes, les symptômes progressent moins vite mais on observe ponctuellement des situations d'attaques graves (environ 10 % des situations au vignoble).

L'accalmie de la fin du mois de juin prend fin avec les pluies du 4 juillet qui donnent lieu à de nouvelles contaminations qui se manifestent par l'apparition généralisée de taches d'huile sur jeunes feuilles (parfois en quantité importante) vers mi-juillet. De nouveaux dégâts sur grappes apparaissent mais évoluent plus lentement que les symptômes foliaires.

Le dernier épisode contaminant de la saison a lieu, à la fermeture de la grappe, lors des pluies de mi-juillet (13 au 16 juillet puis les 18-19 et 20 juillet) et entraîne de nouvelles et rapides sorties de taches sur jeunes feuilles. Le rot

A retenir

- ✓ Une très forte pression
- ✓ Des pluies contaminantes très fréquentes entre fin mai et mi-juin
- ✓ Des dégâts sur grappes ponctuellement sévères




Evolution des attaques de mildiou sur le réseau régional de surveillance : Comparaison des fréquences moyenne d'attaque sur parcelles références (REF) et témoins (TNT)

brun progresse également sur les parcelles déjà atteintes et parfois même sur des parcelles restées indemnes jusque-là. Ce dernier épisode pluvieux étant très long, les sorties de taches se poursuivent jusqu'à fin juillet.

Puis l'installation de conditions chaudes et très sèches en août ralentissent la progression de la maladie sur le feuillage. La période de risque se clôture alors.

En fin de saison, il n'existe quasiment plus aucune parcelle indemne de maladie sur feuilles. Les attaques sur grappes sont également régulières. Leur impact sur la récolte est très hétérogène d'une parcelle à l'autre : de quelques grappes à des dégâts très sévères.

Synthèse des épisodes contaminants de la campagne 2018 sur le vignoble de Fronton :



Les contaminations de masse et les sorties des taches correspondantes sont identifiées par une couleur identique. La hauteur des histogrammes est proportionnelle à la hauteur de la pluie.

• **Black-rot** (*Guignardia bidwellii*)

Compte tenu de la présence d'un inoculum au vignoble et du caractère orageux des pluies du printemps, les conditions étaient réunies pour permettre au champignon de s'exprimer.

Comme chaque année, la période de risque Black-rot est sensiblement plus précoce que celle du mildiou et ce sont les pluies de fin avril (29-30 avril) qui génèrent les premières contaminations, au stade 4-5 feuilles étalées.

Le délai d'incubation étant relativement long à cette période, les taches issues de ces contaminations apparaissent autour du 20 mai et sont visibles régulièrement sur TNT et parcelles traitées parcelles (avec des dégâts plus marqués sur parcelles réputées sensibles).

Sur les parcelles atteintes, les dégâts foliaires progressent lentement mais la pression reste globalement bien maîtrisée.

L'impact des fortes pluies de juin est bien géré, notamment car la gestion du risque mildiou impose la plus grande vigilance et que la mixité des stratégies de gestion peut également couvrir le risque Black-rot. Et les dégâts sur grappes restent rares début juillet.

Une nouvelle progression des symptômes est observée vers le 25 juillet suite aux orages survenus le 4 juillet, au stade grain de pois, rappelant que le champignon reste virulent jusqu'aux portes de la fermeture de grappe.

Les dégâts apparaissent notamment dans les situations à historique. Ils sont assez hétérogènes mais ponctuellement sévères (avec souvent des sorties directement sur grappes).

L'impact global du Black-rot pourrait être considéré comme faible car peu de parcelles sont impactées mais les dégâts sont ponctuellement importants et préjudiciables à la récolte.

• **Oïdium** (*Erysiphe necator*)

Le millésime est marqué par une présence encore plus réduite de l'oïdium que les années antérieures.


Les premiers symptômes sur grappes tardent à apparaître, même dans les situations très sensibles.

Les premières baies touchées sont repérées sur une parcelle à fort historique le 25 juin. Début juillet, les signalements deviennent plus fréquents mais restent cantonnés strictement aux parcelles réputées sensibles et les symptômes excèdent rarement quelques grains touchés.

L'impact de la maladie restera ainsi secondaire jusqu'à la fin de la saison.

A retenir

- ✓ Un parasite secondaire devenu récurrent
- ✓ Une virulence du champignon tard en saison
- ✓ Les orages de juillet à l'origine de contaminations majeures sur grappes
- ✓ Des situations sensibles accusant des dégâts importants



Black-rot sur grappes - Photo CA 81 (24/07/2018)

• **Botrytis** (*Botrytis cinerea*)

La fréquence des épisodes pluvieux au cours de la première moitié du mois de juin est favorable à l'apparition de symptômes sur feuilles, voire sur rafles, souvent observés lors des printemps pluvieux.

Ces dégâts ne sont pas considérés comme impactants pour l'évolution de l'épidémie plus tard en saison.

La floraison est « poussive » et traîne en longueur. Les conditions humides et fraîches sont des facteurs de risque non négligeables.

Le retour de conditions plus chaudes et surtout plus sèches au cours de la 2^e moitié du mois de juin favorise une chute plus rapide des derniers capuchons floraux. Et l'effet de la coulure permet d'aérer les grappes.

Les premiers symptômes sur grappes apparaissent vers le 20 juillet consécutivement, le plus souvent autour de perforations d'Eudémis (G2). Puis, l'alternance de périodes sèches et de périodes orageuses entretient ces foyers et fin juillet la pression botrytis est forte dans les parcelles à forte charge.

Avec l'installation de conditions caniculaires début août, les petits foyers régressent rapidement. Et la configuration des grappes plutôt lâches suite à la coulure permet également de limiter le risque de développement de la maladie.

A retenir

- ✓ Premiers foyers détectés en juillet sur baies perforées par Eudémis
- ✓ Le temps instable de juillet entretient la pression
- ✓ Les conditions chaudes et sèches d'août stoppent la progression des foyers

• **Excoriose** (*Phomopsis viticola*)

La bonne gestion de la maladie lors des précédentes campagnes avait déjà contribué à une baisse de la pression. Cette année encore, la période de sensibilité du végétal a été très courte (stade 6 au stade 9) et s'est terminée avant le retour des pluies de fin avril. L'incidence de la maladie reste donc faible cette année.

RAVAGEURS

• **Vers de la grappe – Eudémis** (*Lobesia botrana*)

• **Première génération**

Le vol démarre timidement vers le 20 avril, date plutôt tardive pour le ravageur. Les captures deviennent plus régulières fin avril.

Les premières pontes sont observées sur les premiers jours de mai, sur parcelles à fort historique.

A cette période, les conditions fraîches et pluvieuses perturbent le repérage du vol par les pièges du réseau.

Et il est même probable que ces conditions aient aussi eu un impact direct sur le vol. Les dernières captures sont enregistrées entre les 20 et 25 mai.

Les glomérules commencent à apparaître fin mai et deviennent plus visibles début juin. Au 10 juin, le seuil de nuisibilité identifié pour la fin de G1 est déjà ponctuellement dépassé. La pression en fin de G1 est donc forte et incite à la vigilance quant à la gestion de la G2 dans les situations concernées.

• **Deuxième génération**

Le 2^e vol démarre sur la dernière décade de juin. Pontes et dégâts de perforations vont rester difficilement observables et peu ou pas de situations à risque sont signalées.

• **Troisième génération**

La 3^e génération s'enchaîne relativement rapidement. Les premières captures significatives sont enregistrées sur les premiers jours d'août.

Des dégâts de perforations sont signalés mi-août sur le secteur de Fronton sud mais peu de nouveaux dégâts sont ensuite signalés.


Fin août, le vol régresse. A cette période, des œufs à tous les stades, ainsi que des perforations, sont visibles. Les premières pontes ont donc déjà éclos et de nouvelles sont encore déposées. Le vol se poursuit jusqu'aux premiers jours de septembre, rallongeant d'autant la période de risque de ponte.

A retenir

- ✓ Une activité des tordeuses tout aussi précoce que l'année
- ✓ Une présence régulière mais faible de dégâts en fin de G1 et de G2
- ✓ Toujours des situations critiques en G3

Les conditions sèches de la fin d'été ne sont pas favorables au développement du botrytis, sans quoi l'impact des attaques d'Eudémis auraient été pu être plus préjudiciables.

Piégeage moyen journalier d'Eudémis sur le réseau de surveillance du vignoble de Fronton – Campagne 2018



	G1	G2	G3
Début du vol	20 avril	20-25 juin	1 ^{er} – 5 août
Pic de vol	5 mai	1 ^{er} juillet	10 août
Premières pontes	5 mai	25 juin	5 août
Premiers dégâts	5 juin	5 juillet	15 - 20 août

• **Erinose** (*Colomerus vitis*)

La virulence du ravageur se confirme, cette année encore, sur les parcelles réputées sensibles, d'autant plus si les conditions du printemps limitent la croissance de la végétation.

Comme chaque année, les dégâts foliaires apparaissent dès l'étalement des premières feuilles.

Les symptômes se généralisent rapidement à une grande majorité des situations, avec des intensités d'attaques globalement faibles.

L'installation de conditions plus favorables à la pousse début mai favorise la dilution des populations du ravageur dans le feuillage et les symptômes foliaires se diluent aussi. Les symptômes restent réguliers mais leur incidence est globalement limitée et les nouvelles sorties sur jeunes feuilles sont plus faibles que ce qui était craint.

Puis de nouveaux symptômes apparaissent ensuite fin juin. Il est devenu habituel de voir resurgir des symptômes estivaux d'érinose, notamment sur les parcelles les plus fortement atteintes au début du printemps.

• **Cicadelle verte** (*Empoasca vitis*)

Depuis 2 ans, les populations de cicadelles restent faibles et peu nuisibles dans une majorité de situations.

Les premières larves de la génération printanière sont signalées vers le 20 mai. Les populations d'abord faibles s'accroissent lentement jusqu'à ponctuellement dépasser le seuil de nuisibilité début juin.

Les situations à risque restent toutefois minoritaires.

La génération estivale s'installe vers le 10 juillet. L'évolution des populations ne présente pas de risque dans la majorité des situations. Mais, selon l'historique insecticide des parcelles (lutte obligatoire Flavescence), les effectifs peuvent être ponctuellement plus importants, jusqu'à engendrer des dégâts de grillure.

ANNEXE

• Répartition spatiale des parcelles d'observations et des pièges

L'évaluation du risque, pour le vignoble Frontonnais, est établie à partir des observations réalisées sur :

- 10 parcelles de références,
- 4 témoins non traités (TNT) (minimum 100 souches non traitées),
- des parcelles flottantes, pour signaler une problématique à un instant t,
- une trentaine de pièges à phéromones permettant de suivre en conditions et temps réels les dynamiques de populations des tordeuses *Eulia* et *Eudémis*.

• Protocoles d'observations et réseau d'observateurs

Sur ces parcelles, des observations sont réalisées par les techniciens de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne et Vinohalie. Ces observations sont réalisées de manière hebdomadaire selon le protocole harmonisé validé par la Direction Générale de l'Agriculture et de l'Alimentation du Ministère de l'Agriculture (voir tableau ci-contre).

		M	A	M	J	J	A	S
Maladies	Mildiou							
	Oïdium							
	Black-rot							
	Botrytis							
	Maladies du bois							
Ravageurs	Vers de la grappe							
	Érinose							
	Acariose							
	Acariens							
	Cicadelle des grillures							
	Cicadelle de la FD							
Auxiliaires	Typhlodromes							

• Dispositif de suivis biologiques

Suivi de la maturité des œufs d'hiver de mildiou

Afin de mieux anticiper les périodes de risque relatives au mildiou, un suivi de la maturité des oospores, ou œufs d'hiver, est réalisé à partir d'échantillons de feuilles collectées sur 4 sites répartis dans les différents vignobles régionaux et conservés en conditions naturelles durant tout l'hiver : Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Lot.

Dès le printemps, chaque semaine, une fraction de chacun de ces lots est expédiée au laboratoire pour être placée en conditions contrôlées (20°C et humidité saturante). Un suivi de la maturité des œufs en conditions réelles est aussi réalisé.

• Dispositif de modélisation et réseau de stations météorologiques

Stations météo	Les modèles utilisés	
2 stations physiques : Fronton Vacquiers + 3 stations « virtuelles »* : Labastide St Pierre Pompignan Villemur	Mildiou	MILVIT Le modèle est utilisé en début de campagne pour anticiper le début de l'épidémie. La pression épidémique, la date et le poids des contaminations sont calculés jusqu'au jour de la rédaction du BSV (pas de données prédictives).
		Potentiel Système C'est un modèle climatique basé sur un référentiel météorologique. Les différentes variables (Ex : la pression épidémique, les dates des contaminations de masse) sont calculées grâce à l'écart entre cette norme et les conditions réelles de la campagne. Pour chaque BSV, le modèle prévoit également l'évolution des différents paramètres selon le scénario météorologique des jours à venir.
	Vers de la grappe - Eudémis	LOB version 2.0 Le modèle permet d'évaluer et d'anticiper la dynamique de la première, deuxième et troisième génération d'Eudémis en fonction du cumul de températures (date du début, pic et fin du vol des adultes, dépôt des pontes, progression des stades de développement des larves). Il ne prend pas en compte les autres facteurs pouvant influencer l'activité réelle des papillons (pluie, vent, faible développement végétatif). Les pontes simulées par le modèle peuvent donc ne pas avoir lieu en conditions réelles.

*réseau de stations « virtuelles » alimenté par les données radar Météo France

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce **BSV Bilan de campagne Viticulture Édition Fronton** a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, la Cave de Fronton et les agriculteurs observateurs.