



Référentiel fourrager

Origine de la référence :
Plaine Roussillon
 5 M d'altitude
 Alluvions récentes
 Terres limoneuses
 Reprise après
 viticulture ou maraîchage
 Nappe phréatique < 10 mètres

3 - Prairie naturelle en sec en plaine du Roussillon

Prairie de fauche de bonne qualité floristique pâturée en hiver par un troupeau ovin.



Itinéraire d'exploitation parcellaire

Année	Hiver	Printemps	Eté		Automne
Réalisé 2010	Pâturage	F 25/05			Pâturage
Réalisé 2011	Pâturage		F1 le 27/06	F2 le 15/08	Pâturage

Selon la somme des températures enregistrées à Alénya la floraison et donc la première coupe de cette prairie devait intervenir autour du **20 mai** en 2010 et du **7 mai** en 2011 !



Coût de production (hors pâturage hivernal ovin)

Année	an	2010	2011	2012	2013
Rendement	TMS/ha	3	9,1		
Dont 1ère coupe		3	6,6		
Dont 2ème coupe		0	2,5		
Frais de mécanisation	€TMS	49	27		
Intrants					
Semences	€TMS	2	2		
Engrais	€TMS	0	0		
Transport		12	12		
Coût total	€TMS	63	41		



Itinéraire technique et détail des coûts de production

Interventions	Détail 1^{ère} coupe 2010	Mécanisation €/ Ha	Intrants €/ Ha
Fauchage	Tracteur et faucheuse 2M8	51	
Fauchage	Tracteur et faneuse andaineuse 3M	16	
Andainage	Tracteur et faneuse andaineuse 3M	18	
Pressage	Pressage BR 120 chambre variable 120/120	60	6 €
Transport	Tracteur + chargeur et camion 3T5	37	
TOTAL		182	6

La météo pluvieuse de 2011 explique à la fois le rendement en 1^{ère} coupe de 6T6 et la date de récolte trop tardive, par rapport à la récolte de 2010 qui fût de qualité « foin de Crau » parce que récoltée en début de floraison. Le pâturage hivernal des ovins est très profitable à la flore toutefois menacée par le drainage irrégulier des prairies selon leur positionnement et l'entretien de moins en moins tenu des « Agouilles ».