

La règle d'or incontournable est intervenir avant la pluie qui va provoquer les prochaines contaminations quand la maladie est en place dans la parcelle ou le secteur.

Le choix de la spécialité a moins d'importance que son positionnement avant la pluie (préventif) ou après la pluie, c'est encore plus vrai pour les produits de contact dont le cuivre.

Le traitement qui est mis en place, protège de ce qui va arriver et non pas de ce qui s'est passé.

L'effet rattrapage des produits est très limité pour cause de sélection des souches résistantes donc érosion de l'efficacité (nul en forte pression 24 h maxi ??) et ne compense jamais en efficacité le positionnement préventif.

L'autre point important est la rémanence du produit qui peut être très variable suivant la famille. Ce point est capital pour le renouvellement de la protection. Exemples en forte pression : base Cymoxanil 4 jours, Anilides (systémiques) 6/7 jours. Ces produits sont déconseillés en forte pression.

Les produits de contact qui sont utilisés seuls ou en partenaires associés sont lessivables à partir d'une pluie de 10 - 15 mm. Exemples : Cuivre, Folpel, Mancozebe, Metirame multi-sites.

Quand positionner la protection ?

Les 1^{ères} taches (quelques-unes) sont sorties le 27 avril, mais le 30 cela se généralise, et le 5 mai tout le département était concerné.

Dès la première fenêtre sans pluie et si le passage tracteur était possible, 29avril/1 mai avec famille des CAA (Ampexio, Pantheos, Sirbel...) 10 jours de protection qui protège jusqu'au 7/8 mai avant les pluies du 9 au 16 mai.

7/8 mai : 2^{ème} protection avec Qil 10-12 jours (Mildicut, Kenkio contiennent Phosphonate) ou (Camaro, Sanblite avec multi-sites).

17 mai : 3^{ème} passage famille Acylpicolide + Phosphonate 10-12 jours de rémanence (14 jours) ou famille OSBPI exemple Pack trel, Pack bria.

29 mai - 1 juin : 4^{ème} passage famille QoSI (Ametoctradine) + Phosphonate Enervin active ou Privest Ouresplend (QoSI + CAA). 10-12 jours.

10 juin : 5^{ème} passage famille CAA + contact exemple Griptop ou Carial 10-12 jours.

Début juillet poursuite avec cuivre.